КОРРЕКЦИЯ КИСЕТНЫХ МОРЩИН С ПОМОЩЬЮ ALIAXIN® И PROFHILO®

Шэрон Дэвидсон* (Sharon Davidson), *Израиль*

Анамнез и жалобы пациента

Женщина 54 лет. Светлая, тонкая, сухая кожа, эластоз на щеках и в периоральной области в значительной степени вызван сокращениями круговой мышцы рта. Потеря объема в области щек. При улыбке заметны кисетные морщины и морщины на щеках. Ранее выполнялись инъекции ботулотоксина. Не курит. Отсутствие текущего стоматологического лечения.

Пациентка жалуется на выраженные возрастные признаки в периоральной области: кисетные морщины и линии марионетки **(рис. 4А)**.

Заключение врача

Сочетанное применение Aliaxin® и Profhilo® привело к улучшению текстуры кожи и естественным результатам.

Пациентка осталась довольна: благодаря сокращению кисетных морщин, линий марионетки и морщин в области



Рис. 1. Препарат и метод

*Доктор Шэрон Дэвидсон начала профессиональную карьеру в качестве стоматолога и проработала в этой области в течение 24 лет. Более 13 лет она активно занималась эстетической медициной и на протяжении этого времени достигла высоких результатов. Благодаря своим уникальным инновационным методам и подходам она занимает лидирующую позицию среди израильских специалистов. У доктора Дэвидсон успешная клиника в самом центре Тель-Авива, где она предлагает полный спектр современных неинвазивных методов коррекции с помощью высокоэффективных филлеров и косметических средств. Разработанные ею технические приемы способствуют индивидуальному подходу и достижению прекрасных естественных результатов лечения, что так ценят все ее пациенты. Ведущий лектор и тренер в области эстетической коррекции лица, на протяжении последних десяти лет доктор Дэвидсон щедро делится знаниями и опытом с сотнями врачей. Она преподает на курсах и проводит практические семинары в своем образовательном центре, а также читает лекции в университете Тель-Авива.

Рис. 2. Схема проведения первой процедуры

Рис. 3. Схема проведения третьей процедуры

комиссур лицо прибрело более молодой вид. При сокращении мышц динамические морщины стали менее выраженными **(рис. 4 Б–В)**.

Препарат и метод

Aliaxin® SR, канюля 25G, в области жирового пакета щеки (веерная техника), включая линии марионетки **(рис. 1)**.

Aliaxin® SR, болюсно, игла 30G, в области кисетных морщин (линейная ретроградная техника).

PROFHILO®, игла 29G, в периоральной области.

Протокол лечения

1-Я ПРОЦЕДУРА (Т0)

Aliaxin®SR вводили в жировой пакет щеки и линии марионетки, использовали канюлю 25G и веерную технику.

Aliaxin®SR вводили также в область кисетных морщин, использовали иглу 30G и линейно-ретроградную технику, инъекции выполняли горизонтально и вертикально **(рис. 2)**.

Общий объем препарата: 2 шприца, 2 мл.

2-Я ПРОЦЕДУРА (ЧЕРЕЗ 2 НЕДЕЛИ)

Dysport®, 30 Ед, в границу красной каймы.

3-Я ПРОЦЕДУРА (ЧЕРЕЗ 4 НЕДЕЛИ ПОСЛЕ Т0)

Profhilo® 0,2 мл, 10 болюсов, игла 29G, в периоральную область **(рис. 3)**.

Общий объем препарата: 1 шприц, 2 мл. ■

Рис. 4. Пациентка, 54 лет, до процедур (А), после 2-й процедуры (Б), после 3-й процедуры (В), через месяц после 3-й процедуры (Г)