ВИТРИНА

ALIAXIN® ИННОВАЦИОННАЯ ЛИНИЯ ФИЛЛЕРОВ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ВОЗРАСТНЫХ ПРОБЛЕМ КОЖИ ЛИЦА И ШЕИ

Новая линия ALIAXIN®, включает шесть видов имплантов, предназначенных для решения различных проблем кожи лица и шеи – SR, FL, GP, EV, LV, SV. Они обладают уникальными свойствами благодаря сочетанию гиалуроновой кислоты различного молекулярного веса и различной степени ретикуляции.

Состав дермальных наполнителей линии ALIAXIN® разработан на основе технологии Hydrolift® Action. Это инновационный подход, направленный на предотвращение уменьшения содержания гиалуроновой кислоты (ГК) в коже с возрастом, восстановление увлажненности, эластичности и тонуса кожи.

Сегодня благодаря знанию основных физиологических механизмов процесса старения изменились взгляды на процедуры эстетической медицины. Все чаще используется комплексный подход для решения любой конкретной проблемы. Это важно с анатомической точки зрения, поскольку воздействие на один участок может повлиять на состояние близлежащих областей. Система Aliaxin® позволяет обрабатывать одновременно двенадцать различных областей и проводить ремоделирование тканей всего лица и шеи (табл. 1).

Упаковка всех филлеров Aliaxin® содержит:

- инструкцию по применению;
- две герметичные блистерные упаковки, включающие одноразовый стерильный шприц объемом 1 мл с однократной дозой препарата, оснащенный ограничителем обратного хода;
- 4 стерильные иглы;
- этикетки для отслеживания препарата.

ТАБЛИЦА 1. **Препараты линии Aliaxin для коррекции различных зон**

Области коррекции	Aliaxin®
Виски	Aliaxin®SR
Глабелла	Aliaxin®GP
Слезная борозда	Aliaxin®SR
Скулы	Aliaxin®EV
Подскуловая область	Aliaxin®SR
Носогубные борозды	Aliaxin®GP
Нос	Aliaxin®EV
Губы	Aliaxin®FL, Aliaxin®LV
Контур губ	Aliaxin®FL
Линия нижней челюсти	Aliaxin®EV, Aliaxin®SV
Подбородок	Aliaxin®EV, Aliaxin®EV
Шея	Aliaxin®SR

ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИЛЛЕРОВ

Aliaxin®SR – моделирование и восстановление

Основная цель применения препарата – восстановление гармоничных пропорций лица и ремоделирование дермы. Текучесть геля способствует его равномерному распределению в тканях при введении в обширные области лица.

Устойчивый и длительный результат достигается благодаря действию геля: устранению атонии кожи, стимуляции и активизации процессов биореструктуризации и выработки нового коллагена. Содержание натуральной гиалуроновой кислоты усиливает эффект восстановления – повышается увлажнение глубоких слоев дермы, кожа выглядит еще более гладкой и естественной (табл. 2).

Эффект увлажнения . . . . . ++++O
Эффект лифтинга . . . . . +++OO
Ретикуляция . . . . . ++□□□

Применение. Введение в среднюю и нижнюю трети лица для:

- объемного ремоделирования дермы (восстановления объемов и создания симметрии);
- повышения тонуса, упругости и эластичности кожи.

ТАБЛИЦА 2. **Характеристика препарата Aliaxin® SR**

Показатели	Aliaxin® SR
Тип геля	Монофазный
Молекулярный вес гиалуроновой кислоты	500, 1000, 2000 кДа
Содержание ретикулированной NaHA	22,5 мг/мл
Содержание натуральной NaHA	2,5 мг/мл
Содержание свободного BDDE	<0,1 ppm
Степень ретикуляции	++
Сила давления на поршень шприца (игла 27G 13 мм)	18 ± 3 Н
Игла	4 x 27G (13 мм) Дополнительная канюля
Глубина ведения	Средние слои дермы

ТАБЛИЦА 3. **Характеристика препарата Aliaxin® FL**

Показатели	Aliaxin®FL
Тип геля	Монофазный
Молекулярный вес гиалуроновой кислоты	500, 1000 кДа
Содержание ретикулированной NaHA	25 мг/мл
Содержание натуральной NaHA	/
Содержание свободного BDDE	<0,1 ppm
Степень ретикуляции	+++
Сила давления на поршень шприца (игла 27G 13 мм)	22 ± 3 Н
Игла	2 x 30G (13 мм) 2 x 27G (13 мм)
Глубина ведения	Слизистая оболочка и средние слои дермы

ТАБЛИЦА 4. **Характеристика препарата Aliaxin® GP**

Показатели	Aliaxin®GP
Тип геля	Монофазный
Молекулярный вес гиалуроновой кислоты	1000, 2000 кДа
Содержание ретикулированной NaHA	25 мг/мл
Содержание натуральной NaHA	/?
Содержание свободного BDDE	<0,1 ppm
Степень ретикуляции	++++
Сила давления на поршень шприца (игла 27G 13 мм)	23 ± 3 Н
Игла	4 x 27G (13 мм)
Глубина ведения	Средние и глубокие слои дермы

Aliaxin®FL – губы

Препарат предназначен для коррекции губ, придания им упругости, создания четкого контура. Aliaxin® FL обладает идеальной вязкостью для введения в периоральную область (табл. 3).

Гель равномерно распределяется в слизистой оболочке губ, благодаря чему достигается оптимальный эстетический результат:

- губы становятся полными и мягкими (эффект увлажнения);
- профиль губ выглядит естественно;
- контур губ четкий и симметричный.

Использование игл 30G повышает комфорт пациента во время процедуры.

Эффект увлажнения ..... +++OO
Эффект лифтинга ..... ++++O
Ретикуляция ..... +++□□

Применение

- Коррекция контура (вермилион) и увеличение объема губ,
- Оральные комиссуры,
- Периоральные морщины.

Aliaxin®GP– общее действие

Характерная особенность препарата – стабильность в ткани. Благодаря этому гарантируется длительное действие и выраженный эффект лифтинга. Свойства препарата достигаются за счет изменения степени ретикуляции геля при сочетании гиалуроновых кислот средней и высокой молекулярной массы (табл. 4).

Препарат идеален для устранения локальных проблем, восстановления объемов и гармоничных пропорций. Подходит для незначительных коррекций ранее полученных результатов и проведения поддерживающих процедур.

Гель обладает превосходной вязкостью и пластичностью, легко вводится интрадермально и хорошо переносится пациентами.

Эффект увлажнения ..... ++OOO
Эффект лифтинга ..... ++++O
Ретикуляция ..... ++++□

Применение

- Глабеллярные морщины,
- Носогубные морщины и складки,
- «Линии марионетки»,
- Для увеличения объема скул и подбородка.

Aliaxin®EV -совершенный объем

Препарат предназначен для восстановления объема тканей лица, создания симметрии и естественных пропорций. Идеален для омоложения лица при возрастной утрате объемов. Вводится в область скул, подбородка и нижнюю часть овала лица, поскольку именно эти участки придают лицу гармоничный и молодой вид. Благодаря эффекту лифтинга и естественному встраиванию в дермальную ткань, ALIAXIN® EV позволяет получить уникальные эстетические результаты и вернуть лицу природную юношескую привлекательность (табл. 5).

Эффект увлажнения ..... +OOOO
Эффект лифтинга ..... +++++
Ретикуляция ..... +++++

Применение

- Увеличение объема скул и подбородка,
- Ремоделирование нижней части овала лица.

Aliaxin®SV – превосходный объем

Применяется при значительном дефиците объема для восстановления четкости овала лица. Вводится в область скул, подбородка и нижнюю часть овала лица, поскольку именно эти участки придают лицу гармоничный и молодой вид. Благодаря эффекту лифтинга и естественному встраиванию в дермальную ткань, ALIAXIN® SV позволяет получить уникальные результаты (табл. 6).

Эффект увлажнения ..... +OOOO
Эффект лифтинга ..... +++++
Ретикуляция ..... +++++

ВИТРИНА

Применение:

- Увеличение объема скул и подбородка
- Ремоделирование нижней части овала лица.

Aliaxin®LV – объем губ

Благодаря оптимальной вязкости подходит для гармоничного увеличения губ, отличается высокой стабильностью в тканях. Свойства геля достигаются с помощью изменения степени ретикуляции при сочетании гиалуроновых кислот средней и высокой молекулярной массы. Благодаря этому гарантируется длительное действие при сохранении объема. Наполнитель обладает превосходной вязкостью и пластичностью, легко вводится интрадермально и хорошо переносится пациентами (табл. 7).

Эффект увлажнения . . . . . ++OOO
Эффект лифтинга . . . . . ++++O
Ретикуляция . . . . . ++++□

Применение

- Глабеллярные морщины,
- Носогубные морщины и складки,
- «Линии марионетки»,
- Для увеличения объема скул и подбородка.

***

Препараты линии Aliaxin® созданы на базе инновационной технологии, обеспечивающей оптимальное встраивание ГК в ткань. Технология создания филлеров Aliaxin® основана на физических параметрах процесса стабилизации и направлена на то, чтобы минимизировать использование BDDE и его содержание в конечном продукте. Благодаря сочетанию ГК с различной молекулярной масой в процессе стабилизации формируется максимальное количество ковалентных связей, что обеспечивает поддержание физиологических процессов в коже. Все это дает возможность получить выраженный естественный гармоничный эффект омоложения без повреждения тканей. LNE

ТАБЛИЦА 5. **Характеристика препарата Aliaxin® EV**

Показатели	Aliaxin®EV
Тип геля	Монофазный
Молекулярный вес гиалуроновой кислоты	1000, 2000 кДа
Содержание ретикулированной NaHA	25 мг/мл
Содержание натуральной NaHA	/?
Содержание свободного BDDE	<0,1 ppm
Степень ретикуляции	+++++
Сила давления на поршень шприца (игла 25G)	30 ± 3 Н
Игла	2 x 25G тонкостенная (12,7 мм) 2 x 25G тонкостенная (19 мм)
Глубина введения	Субдермально/супрапериостально
Упаковка	2 x 1 мл

ТАБЛИЦА 6. **Характеристика препарата Aliaxin®SV**

Показатели	Aliaxin®SV
Тип геля	Монофазный
Молекулярный вес гиалуроновой кислоты	2300 кДа
Содержание ретикулированной NaHA	25 мг/мл
Содержание натуральной NaHA	/
Содержание свободного BDDE	<0,1 ppm
Степень ретикуляции	+++++
Сила давления на поршень шприца (игла 25G)	30 ± 3 Н
Игла	2 x 27G тонкостенная (13 мм) 2 x 27G тонкостенная (19 мм)
Глубина введения	Субдермально/супрапериостально
Упаковка	2 x 1,1 мл

ТАБЛИЦА 7. **Характеристика препарата Aliaxin®LV**

Показатели	Aliaxin®LV
Тип геля	Монофазный
Молекулярный вес гиалуроновой кислоты	1000, 2000 кДа
Содержание ретикулированной NaHA	25 мг/мл
Содержание натуральной NaHA	/
Содержание свободного BDDE	<0,1 ppm
Степень ретикуляции	++++
Сила давления на поршень шприца (игла 27G 13 мм)	23 ± 3 Н
Игла	2 x 27G (13 мм) 2 x 27G (19 мм)
Глубина ведения	Средние и глубокие слои дермы